



QUESTIONNAIRE

SANTE

Information importante, toutes les maladies dermatologiques sont concernées par l'effet Kobner lors duquel tout traumatisme de la peau peut « relancer » la maladie malgré la stabilisation.

Merci de répondre honnêtement à ce questionnaire, le but n'est pas d'empêcher un projet de tatouage mais d'encadrer convenablement et en toute bonne santé notre future séance.

Si tu es sous traitement trithérapie tu peux m'en faire part si tu le souhaites, en effet si c'est ton cas tu fais partie des personnes les moins à risque de ma clientèle car tu ne peux pas me transmettre le VIH.

Les données de ce questionnaire sont et resteront confidentielles sous le sceau du secret professionnel. Merci de le remplir, parapher de tes initiales chaque page et te nommer, dater et signer en page 2.

CONTRE INDICATIONS ABSOLUES (Certificat médical officiel)

	Oui	Non
Es-tu enceinte ou allaitante ? (risque d'imprégnation hormonale, transmission).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As-tu des allergies graves ? Des allergies connues à certains pigments ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu immunodéprimée ou sous traitement immunodépresseur ? (chimio lourde, radiothérapie, corticothérapie en traitement de plus de 15j, greffé d'organe, etc...)..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu stable psychologiquement / psychiatriquement ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu atteint(e) d'une de ces maladies ou as-tu des antécédents : hémophilie, gale, méningite, tuberculose ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As-tu en cours, eczéma, vitiligo, psoriasis, acné purulente, herpès ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En cas de vitiligo, est-il stable ? si oui depuis plus de 5 ans ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu atteint(e) d'un diabète de type 1 auto immune et sous insuline ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As-tu des antécédents de cicatrices chéloïde ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jouis-tu de ton libre arbitre ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu sous anti-coagulant suite valve cardiaque, AVC, embolies ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTRE INDICATION RELATIVE (Avis médical nécessaire, un mail/lettre du médecin serait apprécié)

	Oui	Non
Es-tu sous traitement anti-coagulant suite dialyse, fibrillation auriculaire ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu sous traitement antiagrégant plaquettaire ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu atteint de diabète type 2, non insulinant ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As-tu subi récemment une chimio médicamenteuse ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu épileptique ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu asthmatique ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu atteint de la maladie de Parkinson ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu atteint de la maladie de Willebrand ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es-tu atteint de la maladie de Raynaud ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REMARQUES en cas d'avis médical favorable, seulement concernant les questions des contre-indications relatives :

Anti-coagulant/fluidifiant, si possible arrêter 48h avant le tatouage, et reprendre aussitôt après. Si tu saignes anormalement le pigment ne prendra pas, les croutes ne se formeront pas correctement, en fonction une hausse du tarif pourrait être appliquée. Pour les traitements antiagrégants plaquettaire si possible arrêter 7 jours avant le tatouage, et reprendre immédiatement après la séance.

Les diabètes de type 2 nécessitent une asepsie plus poussée, un suivi de la cicatrisation plus important. En fonction de la zone je peux refuser le tatouage, ou établir un surcoût.

Les chimios médicamenteuses nécessitent une asepsie plus poussée, ce traitement attaque les encres, d'où la disparition ou transformation possible rapide du pigment.

En cas de crise d'épilepsie la séance de tatouage prend fin pour la journée.

En cas d'asthme merci de prendre ta Ventoline. On fera attention de ne pas trop te fatiguer sur la séance.

En cas de maladie de Parkinson, le traitement doit être pris, mais pour des raisons évidentes seules les personnes atteintes de Parkinson sans tremblement pourront être tatouées.

Je ne tatoue pas les personnes atteintes de la maladie de Willebrand au stade 3, pour les personnes atteintes stade 1 ou 2 un avis médical sera demandé.

Je ne tatoue pas les extrémités (doigts, mains, pieds etc...) des personnes atteintes de la maladie de Raynaud.

Avis aux personnes de plus d'1m80, n'hésitez pas à me prévenir si vous vous sentez « bizarre » pendant la séance vous êtes plus sujettes aux malaises vagues que les autres.

Nom, signature, date :

